

MuscaMorte® zur Stallfliegen- bekämpfung



Ställe mit Flüssigmist

MuscaMorte® Güllefliegen

Ophyra aenescens



Voraussetzungen für den Einsatz

- Gülleschwimmschicht
- Keine Gülleentleerung während Ansiedlungsphase (ca. 10 Wochen)
- Keine Unterflurbelüftung
- Kein permanenter Luftzug im Unterflurbereich
- Keine aktiven Larvizide und Wurmmittel in der Gülle
- Wirkt nicht in offenen Güllebehältern (zu viel Licht); in diesem Fall hilft häufigeres Rühren
- Sofern bereits hohe Schadfliegenpopulation vorhanden gelben Amarillo Klebeleim einsetzen

Ausbringung

- Nützlinge sofort nach Erhalt ausbringen
- Versandhüllen an geschützten Plätzen in der Nähe des Güllebereichs aufhängen und öffnen
- Sofern Temperaturen im Güllekeller min. 4°C, können Güllefliegen überwintern. Dennoch ist eine Auffrischung im Frühjahr nötig



Schweinestall

- Sobald die ersten Schadfliegen da sind, mit der Ansiedlung der Nützlinge beginnen
- Erstansiedlung ideal im Frühjahr: 5 x im Abstand von je 2 Wochen, im Sommer Abstand von je 1 Woche, weitere Freilassungen im Abstand von 2-3 Wochen
- Sofern geschlossener Schweinestall ist kein Nachlegen erforderlich
- Nach Güllefahren, Waschen und /oder Desinfizieren wird eine Auffrischung empfohlen

Kuh-, Rinder-, Kälberställe

- Erstansiedlung 5 x im Abstand von je 2 Wochen
- Bei offenen Ställen empfiehlt sich eine kontinuierliche Freilassung von Nützlingen im Abstand von 2-3 Wochen während der gesamten warmen Zeit

Ställe mit Festmist

MuscaMorte® Schlupfwespen

Nasonia vitripennis, Muscidifurax spp.



Voraussetzungen für den Einsatz

- Relativ trockener Mist (Festmist, Tretmist)
- Keine aktiven Insektizidreste im Mist

Ausbringung

- Nützlinge sofort nach Erhalt ausbringen
- Versandhüllen an geschützten Plätzen in der Nähe des Mistbereichs aufhängen und öffnen
- Der Inhalt der Versandhülle kann auch in wenig frequentierten Bereichen der Einstreu, z. B. an der Wand entlang, in der Streu verteilt werden
- Erstausbringung 1-2 Wochen nach dem Ausmisten
- Mindestens 4 Folgefreilassungen im Abstand von jeweils 2 Wochen, im Sommer empfiehlt sich eine kontinuierliche Freilassung im Abstand von ca. 2-3 Wochen

- ✓ Natürlich, kein Einsatz von Chemikalien
- ✓ Hohe Wirksamkeit
- ✓ Keine Rückstände
- ✓ Keine Resistenzen
- ✓ Ungefährlich für Mensch und Tiere
- ✓ Reduziert langfristig Stress für Mensch und Tiere
- ✓ Einfache Anwendung

